



Mejora el tratamiento del cáncer de vejiga, el cuarto más común en hombres

Complementar la cirugía con quimioterapia reduce un 34% el riesgo de recaída

JOSEP CORBELLÀ
 Barcelona

La mortalidad del cáncer de vejiga puede reducirse significativamente si se administra quimioterapia después de extirpar el órgano, según una investigación coordinada en EE.UU. por el oncólogo catalán Joaquim Bellmunt. La investigación permitirá mejorar el tratamiento de los tumores de vejiga, el cuarto tipo de cáncer más frecuente en hombres y el octavo en mujeres en Catalunya.

“Hasta ahora, no había consenso sobre la conveniencia de administrar quimioterapia después de la cirugía”, explica Bellmunt, que dirige el Centro de Cáncer de Vejiga de los hospitales Dana-Farber y Brigham and Women’s de Boston (EE.UU.). En casos en que el cáncer se diagnostica precozmente, el tratamiento consiste en extirpar el tumor preservando la vejiga y sin administrar quimioterapia. En casos en que se diagnostica cuando ya ha causado metástasis, sí se aplica quimioterapia. Pero en casos intermedios, cuando el cáncer ya ha infiltrado la musculatura de la pared de la vejiga pero aún no se ha extendido a otros órganos, no estaba claro qué hacer. Ante la duda,


sólo se administra quimioterapia en un 20% de estos casos intermedios.

Para aclarar si la quimioterapia es más beneficiosa que perjudicial en estos casos, Bellmunt ha realizado un metaanálisis, es decir, un análisis conjunto de datos de varios estudios anteriores. Se trata de una técnica que permite sintetizar datos de un gran volumen de pacientes a partir de estudios más reducidos, de modo que se consigue más potencia estadística y resultados más concluyentes. La investigación, en la que ha colaborado la Escuela de Salud Pública de Harvard, ha reunido datos de 945 pacientes de nueve estudios independientes.

Según los resultados presentados en la revista *European Urology*, administrar quimioterapia reduce un 34% el riesgo de que el cáncer reaparezca y un 23% la mortalidad. El tratamiento suele empezar entre cuatro y seis semanas después de la cirugía y dura tres meses. “Estos resultados permitirán actualizar las guías de tratamiento del cáncer de vejiga”, destaca Bellmunt, que acompaña su trabajo en Boston con la dirección de investigación de tumores genitourinarios en el hospital del Mar en Barcelona.

Con más de 150.000 nuevos casos diagnosticados cada año entre la UE y EE.UU., el cáncer de vejiga es el quinto más frecuente en los países desarrollados, superado únicamente por los de pulmón, colorrectales, mama y próstata. Se trata de un tipo de cáncer vinculado al tabaquismo del que en Catalunya se diagnostican unos 2.200 casos anuales en hombres y 500 en mujeres. ●

PERFIL



Laura Guerrero / Archivo

Bellmunt, director de la investigación, en el hospital del Mar

Del hospital del Mar a Massachusetts

Los hospitales Dana-Farber y Brigham and Women’s de Boston vinieron a fichar a Joaquim Bellmunt al hospital del Mar para que dirigiera su Centro de Cáncer de Vejiga, un consorcio entre ambos hospitales. Nacido en Barcelona en 1959, Bellmunt está reconocido como una de las máximas autoridades en tumores genitourinarios. Sus aportaciones en cánceres de riñón, próstata y vejiga han llevado a mejorar los tratamientos de estos tumores. Ha desarrollado gran parte de su carrera en Vall d’Hebron, donde trabajó veinte años, y en el hospital del Mar, adonde llegó en el 2006. Cuando se trasladó a Boston a principios de año, acordó que seguiría vinculado al hospital del Mar.